# AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP - 5-2-74 710552

TECHNIQUE STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES** 

BULLETIN

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

69426 LYON CEDEX 3 55 Rue Mazenod Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

C. C. P. LYON 9431-17 Régisseur Avances et Recettes D. D. A. 55, Rue Mazenod - 69 - LYON - 3°

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin Nº 2 (nouvelle série)

1er février 1974

#### ABONNEMENTS

Nous rappelons une dernière fois que tous les abonnements non renouvelés à la date du 28 février prochain cesseront d'être servis à partir du mois d'Avril. Se conformer aux recommandations précisées dans les précédents bulletins.

## TRAITEMENTS D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

En raison du départ prématuré de la végétation consécutif à un mois de janvier anormalement doux, le traitements des pêchers et abricotiers à l'aide d'huiles minérales ou de colorants nitrés est dès maintenant déconseillé. Seules les formules associant huiles de pétrole et esters phosphoriques ou Fluenetil peuvent encore être utilisées. Sur les autres essences, toutes les formules pourront encore être utilisées tant qu'aucune manifestation de la végétation ne sera apparente. Nous rappelons toutefois que sur cerisier et prunier (comme d'ailleurs sur abricotier et pêcher pendant le repos hivernal) les doses d'huiles minérales (pétrole ou anthracène) doivent être réduites de moitié par rapport à celles préconisées sur arbres à fruits à pépins.

# CHOIX DES DIFFERENTS PESTICIDES utilisés en traitement d'hiver:

- l'huile d'anthracène: à réserver soit aux arbres recouverts de mousses, algues vertes ou lichens, soit aux vergers subissant des pullulations tenaces de pucerons, acariens, chenilles défeuillantes, tordeuses des pousses et jeunes fruits, cochenilles. Même si l'état des arbres justifie l'application de ces huiles pendant deux années consécutives, il est préférable par la suite d'espacer ces applications.
- les huiles de pétrole ou "huiles blanches" moins décapantes que les précédentes, ont également un excellent effet insecticide et ovicide, notamment contre les cochenilles. Compatibles avec les produits cupriques, elles peuvent sans inconvénient être appliquées chaque année si la situation le justifie.
- les colorants nitrés, anticryptogamiques et insecticides mais essentiellement ovicides. Le Dinoterbe (sous forme acétate ou sel d'ammonium) a des propriétés comparables.
- les huiles jaunes, association d'huile de pétrole et de colorants nitrés, en ont également les propriétés.
- le Fluénétil, associé à des huiles d'anthracène et de pétrole (Lambrol de "la Quinoléine"), est actif contre les formes hivernantes d'acariens, pucerons et psylles en particulier.
- Oléoparathion et Oléomalathion peuvent être utilisés jusqu'au débourrement notamment contre les oeufs d'insectes et d'acariens, les diverses cochenilles.

## PREMIERS TRAITEMENTS DE PRINTEMPS

CLOQUE DU PECHER - En raison de l'avance excessive de la végétation, le traitement contre la cloque devra être appliqué à partir de maintenant dès les premières manifestations de végétation. On utilisera une des formules suivantes:

- bouillie cuprique à 500gr/hl de cuivre-métal
- captane à 250gr/hl de matière active
- ferbame ou thirame à 175gr/hl de m.a.
- captafol à 120gr/hl de m.a.

7.1180

Millel, d :drampy-mesoscit

- zirame à 180gr/hl de m.a.
- association zirame-cuivre

<u>PUCERON VERT DU PECHER</u> (myzus persicae) - Agent de la fausse cloque à ne pas confondre avec le puceron farineux plus tardif. Les conditions climatiques laissent craindre des éclosions imminentes. On profitera de la première période tiède pour appliquer soit une huile jaune ou un colorant nitré si l'état de la végétation le permet encore, soit une association Fluenetil + huile de pétrole. La pulvérisation devra être copieuse et soignée.

### PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 1973 dans la région Rhône-Alpes

Totaux en millimètres des précipitations recueillies en 1973 dans 64 stations de la région et écart % à la moyenne de ces stations.

RHONE	1973	Ecart %	AIN	1973	Ecart %
Monsols	966	-15.0	Gorrevod	527	-38.2
Villié Morgon	505	-32.2	Beaupont	801	-24.4
Blacé	510	-30.2	Izernore	1238	-16.2
Brullioles	554	-26.8	Gex	1120	-17.7
Couzon au Mt d'Or	622	-21.5	Marlieux	707	-15.4
St Symphorien s/Coise	631	-26.2	Ambérieu en Bugey	970	-15.9
Lyon-Gerland	. 620	-13.4	Loyettes	763	-20.1
Communay ·	699	- 9.4	Belley	887	-22.7
	MATERIAL COM	THE ROLL HAVE	Corbonod	841	<del>-</del> 35.5
LOIRE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HTE SAVOIE		
La Pacaudière	779	- 9.3	Thonon	745	-19.3
Perreux	641	- 6.8	Viry	782	-25.7
Fourneaux	764	- 8.3	Cluses	1041	-20.5
Chalmazel	1038	-13.0	Usinens	628	-40.5
Montbrisen	422	-29.7	Thorens	1211	-18.2
Feurs	502	-20.9	Rumilly	. 997	-18.1
St Etienne (Terrenoire)	668 .	- 5.8	St Jorioz	1028	-16.3
St Pierre de Boeuf	551	-21.8	one illying at to imper		ion (sadouadan
ARDECHE			SAVOIE		. mirried
St Marcel les Annonay	743	- 3.8	Novalaise	1223	-16.7
St Agrève	885	- 9.5	Chignin	1065	- 6.2
St Félicien	847	- 3.4	Verrens Arvey	1259	-20.1
Tournon	581	-28.7	Lescheraines	1136	-16.1
St Pierreville	1012	-15.2	Ste Foy Tarentaise	1017	- 3.0
Valgorge	1741	- 4.1	St Julien de Maur.	639	
Aubenas	756	-29.3	Bonneval s/Arc	979	- 1.2
Chomérac	749	-28.0			
DROME	Earl all to		ISERE		E PRACE PL
St Sorlin en Valloire	702	-15.4	Sablons	639	-10.8
Bourg les Valence	612	-36.0	St Quentin Fallavier	696	-23.9
Rochechinard	938	<del>-</del> 20 <b>.</b> 9	La Tour du Pin	835	-22.4
Loriol	671	-21.6	Lumbin	988	-20.0
Saillans	757	-17.2	La Côte St André	661	-27.0
Chatillon en Diois	768	-10.3	St Marcellin	873	-12.3
Chateauneuf du Rhône	594	-37.0	St Martin d'Hères	994	+ 0.5
D <b>ie</b> ulefit	651	<b>-</b> 30.5	Bourg d'Oisans	753	-19.3
. ("estafon Aud el" et /			St Baudille et Pipet	791	-20.7

Après deux années plus ou moins déficitaires, mais jamais dans la totalité de la Circonscription, en 1973 en revanche, le déficit pluviométrique est absolument général. Les précipitations ne sont proches de la moyenne que dans des zones très restreintes, par suite de phénomènes très locaux tels qu'orages (le 20 septembre sur une étroite bande du versant sud-est du Massif central) ou tempêtes de neige (le 24 décembre près de la frontière italienne). Le déficit est particulièrement important dans le Beaujolais et le nord-est de la région .

L'Ingénieur d'Agronomie chargé des Avertissements agricoles P.LATARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription A.PITHIOUD

an an introduction of the angelow

- derbaue va tuitrina à 1/15 cylui de m.s.

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes Directeur-gérant: L.BOUYX